



5. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des analgésiques morphiniques

Interactions médicamenteuses des analgésiques morphiniques – Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)

Analgésiques non morphiniques	Autres médicaments	Niveau	Effet
Agonistes morphiniques	Naltrexone (après-sevrage des opiacés et de l'alcool)	AD	Risque de diminution de l'effet antalgique et/ou d'apparition d'un syndrome de sevrage
	Agonistes-antagonistes morphiniques		
Agonistes-antagonistes morphiniques (buprénorphine, nalbuphine)	Morphiniques agonistes de palier III	CI	Diminution de l'effet antalgique
	Morphiniques agonistes de palier II	AD	Diminution de l'effet antalgique
	Antitussifs morphiniques	AD	Diminution de l'effet antalgique ou antitussif
	Méthadone (sevrage aux opiacés)	CI	Diminution de l'effet de la méthadone
	Naltrexone (après-sevrage des opiacés et de l'alcool)	CI	Risque de diminution de l'effet antalgique et/ou d'apparition d'un syndrome de sevrage
<i>En plus des interactions propres aux agonistes morphiniques</i>			
Péthidine	IMAO non sélectifs ou sélectifs, linézolide	CI	Risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique
Tramadol	Carbamazépine	AD	Risque de diminution des concentrations plasmatiques de tramadol
	IMAO non sélectifs et IMAO-A sélectifs, linézolide	CI	Risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique

Précautions d'emploi des analgésiques morphiniques

Codéine	<ul style="list-style-type: none"> • Éviter toute utilisation prolongée à fortes doses (risque de dépendance) • Utiliser avec prudence chez les conducteurs et utilisateurs de machines et en cas d'insuffisance respiratoire • À éviter chez l'asthmatique • En cas d'insuffisance rénale sévère, espacer les prises d'au moins 8 h • Réduire la posologie chez le sujet âgé • À éviter pendant la grossesse (1^{er} trimestre) et l'allaitement
Tramadol	<ul style="list-style-type: none"> • Éviter toute utilisation prolongée (risque de dépendance) • Prudence en cas d'association : <ul style="list-style-type: none"> - aux antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ou à la venlafaxine (risque de convulsions et/ou de syndrome sérotoninergique) - aux anticoagulants oraux : augmentation de l'effet de l'anticoagulant (contrôle plus fréquent de l'INR) - à la bupropione (risque de convulsions), ou à l'ondansétron (diminution de l'effet antalgique et risques de diminution d'efficacité de l'ondansétron) • Utiliser avec prudence chez les conducteurs et utilisateurs de machines • Réduire la posologie chez le sujet âgé et en cas d'insuffisance hépatique ou rénale • Par voie IV : utiliser sous surveillance médicale stricte
Morphine et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser avec prudence chez le sujet âgé, l'enfant, ou en cas d'insuffisance hépatique, rénale ou respiratoire. La posologie initiale est généralement réduite de moitié chez le sujet âgé (par exemple : 2,5 à 5 mg de morphine orale à libération immédiate 4 à 6 fois/j) ou chez l'insuffisant rénal, puis adaptée en fonction des besoins du patient • Prudence en cas d'association : <ul style="list-style-type: none"> - aux autres agonistes morphiniques ou antitussifs morphiniques (risque majoré de dépression respiratoire) - aux déprimeurs du SNC (barbituriques, alcool, benzodiazépines) : majore le risque de dépression respiratoire et la sédation - à la rifampicine (diminution d'efficacité de la morphine) • Utiliser avec prudence chez les conducteurs et utilisateurs de machines • Associer un antispasmodique dans les coliques hépatiques ou néphrétiques • Prévenir la constipation par un laxatif et les nausées par un antiémétisant • Grossesse : ne pas utiliser en cas de prématurité et après 5 cm de dilatation du col au cours du travail (risque de dépression respiratoire du nouveau-né) • Syndrome de privation du nouveau-né en cas de toxicomanie chez la mère