6. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des analgésiques non morphiniques

Interactions médicamenteuses des analgésiques non morphiniques – Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)

Analgésiques non morphiniques	Autres médicaments	Niveau	Effet
Analgésiques antipyrétiques anti-inflammatoires			
Aspirine (sauf en cas d'utilisation à des doses antiagrégantes plaquettaires)	Méthotrexate	CI	Augmentation de la toxicité hématologique du méthotrexate (pour les doses > 20 mg/semaine)
	Anticoagulants oraux	CI	Augmentation du risque hémorragique pour posologie d'aspirine ⩾ 1 g/prise ou ⩾ 3 g/j ou pour posologie d'aspirine ⩾ 500 mg/prise ou < 3 g/j et en cas d'antécédent d'ulcère gastroduodénal
		AD	Dans les autres cas
	Héparine (HNF ou HBPM à dose curative et/ou sujet âgé)	AD	Augmentation du risque hémorragique
	Glucocorticoïdes	AD	Augmentation du risque hémorragique pour posologie d'aspirine ⩾ 1 g/prise ou ⩾ 3 g/j
	Clopidogrel	AD	Majoration du risque hémorragique (sauf dans le cas d'indication validée pour cette association)
	Ticlopidine, anagrélide	AD	Majoration du risque hémorragique
	Pemetrexed	AD	Majoration de la toxicité du pemetrexed

Analgésiques non morphiniques	Autres médicaments	Niveau	Effet
	Uricosuriques	AD	Diminution de l'effet uricosurique
	Autres AINS	AD	Augmentation du risque d'apparition d'ulcèreset d'hémorragies digestives
AINS	Aspirine et autres AINS	AD	Augmentation du risque d'apparition d'ulcères et d'hémorragies digestives
	Anticoagulants oraux, héparines (à doses curatives et/ou sujet âgé)	AD	Augmentation du risque hémorragique
	Méthotrexate	AD	Augmentation de la toxicité hématologique du méthotrexate (pour les doses > 20 mg/semaine)
	Lithium	AD	Augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques
	Pemetrexed	AD	Majoration de la toxicité du pemetrexed

Précautions d'emploi des analgésiques non morphiniques

Analgésiques purs	
Néfopam	• Prudence chez l'insuffisant hépatique ou rénal • Administrer de préférence chez le patient couché • Utilisation déconseillée pendant la grossesse ou l'allaitement
Analgésiques antipyrétiques	
Paracétamol	• Espacer les prises d'au moins 4 h et ne pas dépasser les doses maximales indiquées • En cas de traitement par anticoagulant oral : contrôle plus fréquent de l'INR (augmentation de l'effet de l'anticoagulant en cas de prise de paracétamol à 4 g/j pendant au moins 4 jours)

Analgésiques antipyrétiques anti-inflammatoires	
Salicylés AINS	• Prudence chez les asthmatiques (salicylés) et en cas d'antécédents ulcéreux ou d'hémorragie digestive • Surveillance de la diurèse et de la fonction rénale chez les insuffisants rénaux chroniques, les insuffisants cardiaques et les cirrhotiques • Surveillance de la fonction rénale chez le sujet âgé et/ou déshydraté, notamment en cas de traitement associé par diurétique, sartan ou IEC (hydrater le malade) • Prudence en cas d'association à la ciclosporine ou au tacrolimus (surveiller la fonction rénale en raison d'une majoration des effets néphrotoxiques) • Utilisation déconseillée dans la goutte (salicylés) • Administration déconseillée au cours des 5 premiers mois de la grossesse, ainsi que pendant l'allaitement • En cas de varicelle ou de zona, les AINS doivent être évités pour traiter la fièvre ou la douleur (risque de complications cutanées graves). Préférer le paracétamol