



9. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des AINS

*Interactions médicamenteuses des AINS (pour les salicylés, voir le **complément en ligne n° 6**) – Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)*

AINS	Autres médicaments	Niveau	Effet
Interactions majeures			
	Anticoagulants (AVK et héparines à doses curatives et/ou sujet âgé)	AD	Augmentation du risque hémorragique
		CI	Pour le piroxicam et l'aspirine à dose anti-inflammatoire
	Méthotrexate	AD	Augmentation de la toxicité hématologique du méthotrexate (pour des doses > 20 mg/semaine); cette interaction est surtout marquée avec le kétoprofène et les salicylés
	Lithium	AD	Risque d'augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques
	Pemetrexed	AD	Majoration de la toxicité du pemetrexed
	AINS entre eux (y compris les salicylés à fortes doses)	AD	Augmentation du risque d'apparition d'ulcères et d'hémorragies digestives

Précautions d'emploi des AINS

- Administration prudente et sous surveillance chez les malades présentant :
 - des antécédents digestifs
 - des troubles de la coagulation
 - des antécédents de perturbations hématologiques
- Une surveillance attentive de la diurèse, de la kaliémie (risque d'hyperkaliémie) et de la fonction rénale est nécessaire :
 - en début de traitement
 - chez les malades insuffisants cardiaques, cirrhotiques et néphrotiques chroniques
 - chez les patients prenant un traitement diurétique ou antihypertenseur (diurétiques, IEC, antagonistes de l'angiotensine II), ou présentant une hypovolémie ou une déshydratation, et chez le sujet âgé
 - après une intervention chirurgicale majeure
- Prudence en cas d'association à la ciclosporine ou au tacrolimus (surveiller la fonction rénale en raison d'une majoration des effets néphrotoxiques)
- Les antiagrégants plaquettaires, les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) et la corticothérapie majorent le risque d'hémorragie digestive
- Prévenir les patients de l'apparition possible de légères sensations de vertiges ou d'autres troubles du SNC (conducteurs de véhicules et utilisateurs de machines dangereuses)
- Administration déconseillée au cours des 5 premiers mois de la grossesse (risque d'avortement spontané et de malformations), ainsi que pendant l'allaitement
- Utilisation déconseillée dans la goutte (salicylés)