



10. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des anti-ostéoporotiques

Interactions médicamenteuses des anti-ostéoporotiques

Aucune interaction médicamenteuse de niveau « contre-indication » ou « association déconseillée » n'est actuellement décrite pour les médicaments de l'ostéoporose.

Précautions d'emploi des anti-ostéoporotiques

| | |
|----------------|---|
| Biphosphonates | <ul style="list-style-type: none"> • Respecter les modalités d'administration (voir « Administration et conseils au patient ») • Utiliser avec prudence en cas d'affection gastro-intestinale haute évolutive • Corriger préalablement les troubles du métabolisme calcique (carence en vitamine D, hypocalcémie) • Prendre les biphosphonates à distance de sels de calcium, de fer et des topiques gastro-intestinaux |
| Raloxifène | <ul style="list-style-type: none"> • Examen gynécologique complet en cas de saignement utérin • Prudence en cas d'association aux antivitamines K |
| Tériparatide | <ul style="list-style-type: none"> • Prudence en cas d'association aux digitaliques • Prudence chez les conducteurs et utilisateurs de machines (hypotension, vertiges) |
| Dénosumab | <ul style="list-style-type: none"> • Supplémentation en calcium et vitamine D • Examen dentaire avec soins préventifs appropriés à réaliser avant tout traitement |
| Œstrogènes | <ul style="list-style-type: none"> • Prudence en cas de : endométriose, fibrome utérin, tumeur bénigne du sein, tumeur hypophysaire, antécédents familiaux de cancer du sein, obésité, diabète, hypertriglycéridémie, HTA, insuffisance rénale, épilepsie, troubles hépatiques, antécédents de cholestase, tabagisme |
| Calcium | <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance régulière de la calcémie et de la calciurie. L'hypercalcémie pourrait être associée à une majoration du risque cardiovasculaire • Respecter un intervalle de 2 heures entre les prises orales de calcium et de biphosphonates |