

e

### 117. Interactions médicamenteuses des antipaludéens – Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)

Antipaludéens	Autres médicaments	Niveau	Effet	Remarques
Quinine (Voie IV)	Méfloquine	AD	Risque majoré d'apparition de crises convulsives	Respecter un intervalle de 12 h entre l'administration IV de quinine et de méfloquine
	Inhibiteurs de protéases	AD	Risque de majoration des effets indésirables de la quinine	
	Rifampicine	AD	Risque de baisse d'efficacité de la quinine (augmentation de son métabolisme hépatique)	
Méfloquine	Acide valproïque, valpromide	CI	Risque de survenue de crises épileptiques par augmentation du métabolisme de l'antiépileptique et effet convulsivant de la méfloquine	
	Quinine (voie IV)	AD	Risque majoré d'apparition de crises convulsives	Respecter un intervalle de 12 h entre la fin de l'administration de quinine et de méfloquine
Artéméter + luméfantine	Clarithromycine, érythromycine Inhibiteurs de protéases boostés par le ritonavir Itraconazole Kétoconazole	AD	Risque majoré de troubles du rythme ventriculaire	Interrompt si possible les autres médicaments, sinon surveillance ECG monitorée

Antipaludéens	Autres médicaments	Niveau	Effet	Remarques
	Médicaments donnant des torsades de pointe			
Doxycycline	Rétinoïdes Vitamine A	CI	Risque d'hypertension intracrânienne	