



118. Interactions médicamenteuses des vaccins et des immunoglobulines

Interactions médicamenteuses des vaccins – Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)

Vaccins	Autres médicaments	Niveau	Effet
Vaccins vivants atténués (BCG, rubéole, rougeole, oreillons, varicelle, fièvre jaune)	Glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone en traitement substitutif)	AD	Risque de maladie vaccinale généralisée, potentiellement mortelle
Vaccins vivants atténués (BCG, rubéole, rougeole, oreillons, varicelle)	Cytotoxiques	AD	Risque de maladie vaccinale généralisée, potentiellement mortelle (remarque : utiliser un vaccin inactivé lorsqu'il existe)
Vaccin anti-amarile (fièvre jaune)	Cytotoxiques	CI	Risque de maladie vaccinale généralisée mortelle

Interactions médicamenteuses des immunoglobulines

Risque d'inefficacité des vaccins à virus vivants (rougeole, rubéole, oreillons et peut-être aussi vaccin anti-amaril) : ne pas injecter d'immunoglobulines dans les 15 jours suivant ces vaccins et ne pas faire ces vaccins dans les 6 semaines suivant l'administration d'immunoglobulines