

e 121. Indications des médicaments antiépileptiques

Antiépileptiques	Types d'épilepsie	Autres indications
Phénobarbital GARDENAL	Épilepsies à l'exclusion du « petit mal » (absences) Prévention des récurrences de convulsions hyperpyrétiques chez l'enfant	Certains cas d'ictère néonatal
Valproate de sodium DEPAKINE	Épilepsies généralisées ou partielles État de mal épileptique (forme injectable) Épilepsies focalisées Troubles du comportement liés à l'épilepsie Prévention des récurrences de convulsions hyperpyrétiques de l'enfant Tics de l'enfant, hoquets irréductibles	
Benzodiazépines Diazépam VALIUM	État de mal épileptique (voie parentérale) Crises convulsives (voie intrarectale) Prévention des convulsions hyperthermiques	Voie parentérale : tétanos, delirium tremens, crises d'angoisse aiguë, états d'agitation et d'anxiété, prémédication Voie orale : anxiété, contractures musculaires, états névrotiques, désintoxication alcoolique, insomnies d'endormissement
Clonazépam RIVOTRIL	Toutes les formes d'épilepsie rebelle État de mal épileptique (voie parentérale) Encéphalopathies épileptiques de l'enfant	Douleurs de désafférentation fulgurantes Néuralgies du trijumeau
Carbamazépine TEGRETOL	Épilepsies à l'exclusion du « petit mal » Troubles caractériels des épileptiques	Néuralgies faciales essentielles et douleurs de désafférentation Prévention des rechutes des psychoses maniaco-dépressives Certains états d'excitation maniaque

Antiépileptiques	Types d'épilepsie	Autres indications
Oxcarbazépine TRILEPTAL	Épilepsies partielles avec ou sans généralisation secondaire en monothérapie ou en association à un autre antiépileptique	
Éthosuximide ZARONTIN	Absence (« petit mal »), crises myocloniques et atoniques, en monothérapie ou en association à un autre antiépileptique	
Phénytoïne DIHYDAN	Épilepsies à l'exclusion du « petit mal » État de mal épileptique (forme inj.)	Névralgies faciales essentielles Troubles du rythme cardiaque (forme inj.)
Fosphénytoïne PRODILANTIN	États de mal épileptique de type tonicoconvulsif	Prévention et traitement des crises convulsives survenant après une intervention neurochirurgicale et/ou un traumatisme crânien
Vigabatrine SABRIL	Épilepsies rebelles aux autres traitements antérieurs, particulièrement les épilepsies partielles (réduction de moitié de la fréquence des crises chez 50 % des patients) à l'exclusion du « petit mal » Spasmes infantiles (syndrome de West) résistants à la corticothérapie, en particulier liés à une sclérose de Bourneville, en monothérapie	
Felbamate TALOXIA	Traitement du syndrome de Lennox-Gastaut de l'adulte et de l'enfant à partir de 4 ans en complément du traitement antérieur non contrôlé par les autres antiépileptiques	
Gapabentine NEURONTIN	Épilepsies partielles de l'adulte et de l'enfant de plus de 3 ans en association avec d'autres antiépileptiques lorsque ceux-ci sont insuffisamment efficaces	Névralgies postzostériennes

Antiépileptiques	Types d'épilepsie	Autres indications
Lamotrigine LAMICTAL	Épilepsies réfractaires aux antiépileptiques habituels : crises partielles simples et complexes, crises généralisées, en monothérapie ou en complément d'un traitement anticomitial antérieur, chez l'adulte et l'enfant de plus de 2 ans	
Eslicarbazépine ZEBINIX	En association dans le traitement des épilepsies partielles avec ou sans généralisation secondaire	
Topiramate EPITOMAX	Épilepsies partielles en association avec d'autres antiépileptiques lorsque ceux-ci sont insuffisamment efficaces Crises généralisées tonico-cloniques	Traitement de fond des migraines de l'adulte rebelles aux autres traitements
Tiagabine GABITRIL	Épilepsies partielles avec ou sans crises secondairement généralisées, en association à d'autres antiépileptiques si ceux-ci sont insuffisamment efficaces	
Prégabaline LYRICA	Crises épileptiques partielles de l'adulte avec ou sans généralisation secondaire, en association à un autre antiépileptique	Douleurs neuropathiques périphériques de l'adulte
Zonisamide ZONEGRAN	Épilepsies partielles de l'adulte avec ou sans généralisation secondaire, en association à un autre antiépileptique	
Lévétiracétam KEPPRA	Épilepsies partielles de l'adulte ou de l'enfant avec ou sans généralisation secondaire, en monothérapie ou en association d'un traitement antérieur Crises myocloniques de l'épilepsie myoclonique juvénile en association à d'autres traitements antiépileptiques chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans	
Lacosamide VIMPAT	Crises partielles avec ou sans généralisation secondaire chez l'adulte et l'enfant de plus de 16 ans, en association	

Antiépileptiques	Types d'épilepsie	Autres indications
Stiripentol DIACOMIT	Traitement des convulsions tonico-cloniques généralisées chez le nourrisson atteint d'une épilepsie myoclonique sévère en association au valproate de sodium et au clobazam	
Pérampanel FYCOMPA	En association dans le traitement des crises d'épilepsie partielles avec ou sans généralisation secondaire chez les patients de 12 ans et plus	