



## 125. Précautions d'emploi des médicaments de la maladie d'Alzheimer

<p>Inhibiteurs de la cholinestérase</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser avec prudence en cas de bradycardie sinusale ou de troubles de la conduction cardiaque, d'asthme ou de BPCO, de rétention urinaire ou d'antécédents d'ulcères gastro-duodénaux</li> <li>• Examen cardiologique avec ECG préalable</li> <li>• Adaptation de la posologie en cas d'insuffisance hépatique modérée à sévère pour la galantamine (posologie maximale de <math>2 \times 8</math> mg/jour)</li> <li>• L'utilisation simultanée de médicaments anticholinergiques (atropiniques) peut réduire l'efficacité du traitement</li> <li>• Les inhibiteurs enzymatiques du cytochrome P450 (kétoconazole, itraconazole, quinidine, érythromycine, fluoxétine) peuvent augmenter les concentrations plasmatiques des anticholinestérasiques, notamment de donépézil</li> <li>• Prévenir l'anesthésiste en cas d'anesthésie générale (interruption du traitement 24 h avant toute intervention chirurgicale)</li> </ul>
<p>Antagoniste des récepteurs NMDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser avec prudence en cas d'antécédents cardiovasculaires (infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque), d'hypertension artérielle et chez les conducteurs ou utilisateurs de machines dangereuses</li> <li>• Examen cardiologique avec ECG préalable</li> <li>• Adaptation posologique : réduire la posologie à 10 mg/jour si la clairance de la créatinine est comprise entre 40 et 60 mL/min</li> <li>• D'autres médicaments antagonistes NMDA (amantadine, kétamine, dextromorphan) peuvent majorer les effets indésirables de la mémantine (psychoses)</li> <li>• Les effets de la L-dopa et des agonistes dopaminergiques peuvent être augmentés et les effets des neuroleptiques diminués</li> <li>• Grossesse et allaitement : utilisation déconseillée</li> </ul>