



126. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des antimigraineux

Interactions médicamenteuses des antimigraineux –
Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)

Antimigraineux	Autres médicaments	Niveau	Effet
Antalgiques et AINS	Voir <i>complément en ligne n° 5</i> (morphiniques), <i>complément en ligne n° 6</i> (non morphiniques) et <i>complément en ligne n° 9</i> (AINS)		
Dérivés ergotés vasoconstricteurs	Macrolides (sauf spiramycine)	CI	Risque de vasoconstriction coronaire ou des extrémités (ergotisme) ou de poussées hypertensives
	Itraconazole, kétoconazole, posaconazole, voriconazole	CI	
	Inhibiteurs de protéases boostés par le ritonavir	CI	
	Triptans	CI	Risque d'hypertension artérielle et de vasoconstriction artérielle coronaire
	Bromocriptine et autres agonistes dopaminergiques dérivés de l'ergot de seigle	AD	Risque de vasoconstriction et/ou de poussées hypertensives
	Sympathomimétiques	AD	
Triptans	Dérivés ergotés vasoconstricteurs	CI	Risque d'hypertension artérielle et de vasoconstriction artérielle coronaire
	IMAO	CI ou AD	
	Linézolide	CI ou AD	
Bêtabloquants	Voir <i>complément en ligne n° 48</i>		
Topiramate	Millepertuis	CI	Risque de diminution d'efficacité de l'anticonvulsivant
	Contraceptifs œstroprogestatifs ou progestatifs	AD	Diminution d'efficacité du contraceptif

Précautions d'emploi des antimigraineux

Antalgiques et AINS	Voir <i>complément en ligne n° 5</i> (morphiniques), <i>complément en ligne n° 6</i> (non morphiniques) et <i>complément en ligne n° 9</i> (AINS)
Dérivés ergotés	Ne pas dépasser les doses maximales prescrites
Triptans	Ne pas dépasser les doses maximales prescrites Prudence chez les conducteurs ou utilisateurs de machines dangereuses
Bêtabloquants	Voir <i>complément en ligne n° 48</i>
Oxétorone, pizotifène, topiramate, flunarizine	Prudence chez les conducteurs ou utilisateurs de machines dangereuses La prise d'alcool doit être évitée (sédation accrue)
Topiramate	Prudence en cas d'association au valproate de sodium (risque d'hyperammoniémie ou d'encéphalopathie). Surveillance clinique à renforcer