



138. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des antitussifs

Interactions médicamenteuses des antitussifs – Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)

Antitussifs	Autres médicaments	Niveau	Effet
Dextrométhorphan	IMAO non sélectifs, IMAO sélectifs A	CI	Risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique*
Autres antitussifs opiacés	Alcool Médicaments déprimeurs du SNC**	AD	Risque de somnolence accru
Antitussifs antihistaminiques	Alcool	AD	Majoration de l'effet sédatif

* Le syndrome sérotoninergique se manifeste par l'apparition parfois d'un ensemble de symptômes pouvant nécessiter l'hospitalisation, voire entraîner le décès (agitation, confusion, hypo ou hypertension, tachycardie, hyperthermie, myoclonies, tremblements, rigidité).

** Analgésiques morphiniques, antidépresseurs sédatifs, antihistaminiques H1, barbituriques, hypnotiques, neuroleptiques, anxiolytiques, méthadone, sédatifs.

Précautions d'emploi des antitussifs

- Identifier sans ambiguïté la cause de la toux.
- Éviter toute utilisation prolongée à fortes doses avec codéine et codéthyline (risque modéré de dépendance).
- Si la toux persiste à un antitussif administré à une posologie usuelle, ne pas procéder à une augmentation des doses, mais à un réexamen de la situation clinique.
- Utiliser avec prudence chez les utilisateurs de machines, conducteurs requérant vigilance, chez les sujets âgés, et en cas d'insuffisance respiratoire.
- Grossesse : à éviter au 1^{er} trimestre.
- Allaitement : à éviter par prudence.
- Utiliser l'antitussif pendant le temps le plus limité possible et aux doses minimales actives.
- Être très prudent chez l'enfant et avoir recours à de faibles doses du fait de différences de sensibilité individuelle marquées.