



14. Précautions d'emploi des anesthésiques généraux injectables

- L'irritation veineuse des agents IV peut être limitée soit en les diluant, soit en les injectant lentement. Pour le propofol, la douleur dans le bras à l'injection du médicament peut être supprimée par adjonction de lidocaïne dans la seringue sous garrot.
- La posologie doit être adaptée en fonction du terrain : sujet âgé, cirrhotique, insuffisant rénal.
- Ils peuvent provoquer une apnée ; l'intensité de ces effets respiratoires dépend de la dose et de la vitesse d'injection.
- Le thiopental doit être administré par voie intraveineuse stricte.
- Le propofol doit être utilisé avec précaution chez les insuffisants cardiaques, rénaux, respiratoires ou hépatiques et en cas d'hypovolémie. Il faut s'assurer que le patient épileptique a bien reçu son traitement.
- L'étomidate doit être utilisé avec prudence chez le malade épileptique.
- La kétamine doit être utilisée avec prudence en cas d'hypertension intracrânienne, d'hypertension artérielle, d'antécédent d'accident vasculaire cérébral ou d'insuffisance cardiaque sévère.
- Lors de l'utilisation intraveineuse de midazolam chez des sujets fragiles ou insuffisants respiratoires, il convient de prévoir une assistance respiratoire pour corriger une éventuelle hypoventilation.