



148. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des hypnotiques

Interactions médicamenteuses des hypnotiques

Hypnotiques	Autres médicaments	Niveau	Effet
Hypnotiques	Alcool	AD	Majoration de l'effet sédatif
Hypnotiques phénothiaziniques	Médicaments à effets anticholinergiques : atropine, antiparkinsoniens, antispasmodiques, antisécrétoires, antidépresseurs imipraminiques, antihistaminiques H1	AD	Majoration des effets atropiniques

Précautions d'emploi des hypnotiques

- Utiliser avec prudence chez les conducteurs de machines, sujets âgés, en cas d'insuffisance hépatique, rénale ou respiratoire.
- Prescrire à la posologie la plus faible pendant une courte durée.
- Éviter tout traitement à fortes doses.
- Modalités d'arrêt progressif du traitement.
- Administration prudente des hypnotiques phénothiaziniques chez les épileptiques, les parkinsoniens.
- Prudence lors des associations médicamenteuses suivantes :
 - zopiclone + rifampicine : diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité de la zopiclone. Surveillance clinique et utilisation éventuelle d'un autre hypnotique
 - zolpidem + rifampicine : diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité du zolpidem. Surveillance clinique et utilisation éventuelle d'un autre hypnotique