



19. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des anesthésiques locaux

Interactions médicamenteuses des anesthésiques locaux – Niveaux contre-indication (CI) et précaution d'emploi (PE)

Anesthésiques locaux	Autres médicaments	Niveau	Effet
Lidocaïne injectable	Bêtabloquants Cimétidine Fluvoxamine Amiodarone	PE	Augmentation des concentrations de lidocaïne nécessitant surveillance clinique et ECG
Formes adrénalinées de lidocaïne	IMAO Antidépresseurs tricycliques	CI	Risque de poussées hypertensives

Ces interactions médicamenteuses sont limitées du fait de l'administration de l'anesthésique par voie locale. Elles sont marquées lorsque la lidocaïne est utilisée par voie IV comme antiarythmique.

Précautions d'emploi des anesthésiques locaux

Lors d'anesthésie locale
<ul style="list-style-type: none"> • Interrogatoire du patient (connaissance du terrain, antécédents allergiques) • Utiliser avec prudence en cas de lésions cutanées ou des muqueuses
Lors d'anesthésie locorégionale
<ul style="list-style-type: none"> • Prémédication par une benzodiazépine à dose modérée • Disposer d'une voie veineuse, prévoir le matériel de réanimation, les médicaments d'urgence (anticonvulsivants, atropine, vasopresseurs), surveillance électrocardiographique continue • Injecter strictement hors des vaisseaux (sauf anesthésie locorégionale intraveineuse) • Pratiquer une injection test de 3 à 4 mL pour les formes adrénalinées, injecter lentement en réaspirant fréquemment • Ne pas utiliser les formes adrénalinées pour l'anesthésie des extrémités • Maintenir le contact verbal avec le patient • Réduire si besoin la posologie en cas d'insuffisance cardiaque ou hépatique sévère, d'hypovolémie, d'hypoxie, d'hyperkaliémie ou d'acidose