



36. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des ARA II

Interactions médicamenteuses des ARA II

Les interactions médicamenteuses des ARA II sont considérées par extrapolation identiques à celles des IEC.

Principales interactions médicamenteuses des ARA II – Niveau association déconseillée (AD)

ARA II	Autres médicaments	Niveau	Effet
	Potassium, « sels de régime » Diurétiques hyperkaliémisants	AD	Sauf si existence d'une hypokaliémie Risque d'hyperkaliémie
	Lithium	AD	Augmentation de la lithémie
	Estramustine	AD	Majoration du risque d'angioedème

Précautions d'emploi des ARA II

Surveillance de la kaliémie et de la créatininémie, notamment chez le sujet âgé et chez l'insuffisant rénal ou cardiaque
Réduction posologique chez l'insuffisant hépatique
Prudence en cas d'association aux AINS (y compris l'aspirine pour une posologie ≥ 1 g/prise ou ≥ 3 g/j) en raison de la majoration du risque d'insuffisance rénale chez le patient déshydraté (hydrater le patient et surveiller la fonction rénale en début de traitement)
En cas d'association à l'éplérénone (INSPIRA), il existe un risque de majoration de l'hyperkaliémie, notamment chez le sujet âgé
Grossesse (1 ^{er} trimestre) : utilisation déconseillée