67. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des contraceptifs oraux

Interactions médicamenteuses des contraceptifs oraux – Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)

Contraceptifs oraux	Autres médicaments	Niveau	Effet
Œstroprogestatifs	Rifampicine	CI	Risque de grossesse
	Inducteurs enzymatiques : - rifabutine - barbituriques - carbamazépine - oxcarbazépine - phénytoïne - fosphénytoïne - griséofulvine - modafinil	AD	Les médicaments inducteurs enzymatiques diminuent l'efficacité des contraceptifs oraux Choisir une pilule dosée à 50 µg d'éthinylœstradiol avec contraception locale ou utiliser de préférence une autre méthode contraceptive, en particulier de type mécanique
Progestatifs minidosés	Inducteurs enzymatiques cités *supra*	AD	Baisse d'efficacité des progestatifs minidosés
Œstroprogestatifs Progestatifs	Millepertuis	CI	Risque de baisse d'efficacité voire d'annulation de l'effet contraceptif Utiliser de préférence une autre méthode contraceptive, de type mécanique
	Nelfinavir Ritonavir Topiramate	AD	Utiliser de préférence une autre méthode contraceptive

Précautions d'emploi des contraceptifs oraux

Œstroprogestatifs oraux	• Bilan préalable puis annuel : examen clinique, frottis cervico-vaginal, bilan lipido-glucidique • Mammographie tous les 2 à 3 ans • Arrêter la pilule en cas d'effets indésirables graves, d'immobilisation prolongée, et 1 mois avant une intervention chirurgicale programmée
Progestatifs microdosés oraux	• Bilan clinique initial et surveillance gynécologique périodique (seins, utérus), frottis cervico-vaginaux • En cas d'aménorrhée, faire un test de grossesse • À éviter chez les femmes ayant des manifestations d'hyperœstrogénie relative (dystrophie ovarienne, hyperplasie endométriale, fibromes utérins...), ou des antécédents de grossesse extra-utérine, de salpingite ou d'ictère gravidique • Utilisation peu souhaitable chez la femme de plus de 40 ans (hyperœstrogénie induite) • Suspendre le traitement en cas de récidive d'ictère ou de prurit chez la femme ayant des antécédents d'ictère ou de prurit gravidique
Progestatifs contraceptifs et œstroprogestatifs	Précautions d'emploi en cas de traitement associé au bosentan ou à la griséofulvine (risque de diminution de l'efficacité contraceptive) : utiliser une méthode contraceptive fiable additionnelle ou alternative pendant la durée de l'association et un cycle suivant
Progestatifs non contraceptifs associés ou non à un œstrogène	Précautions d'emploi en cas de traitement associé aux inducteurs enzymatiques (diminution de l'efficacité du progestatif) : surveillance clinique et adaptation éventuelle de la posologie du traitement hormonal pendant l'administration de l'anticonvulsivant inducteur et après son arrêt