



74. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des antiagrégants plaquettaires

Interactions médicamenteuses

D'une manière générale, l'association de plusieurs antiagrégants plaquettaires majore le risque de saignement, de même que leur association aux héparines ou analogues, aux autres anticoagulants oraux et aux thrombolytiques. Toute association de ce type doit être prise en compte en maintenant une surveillance régulière clinique et biologique.

L'association de l'aspirine à forte dose (doses anti-inflammatoires) avec les AVK ou le méthotrexate à posologie $> 15\text{mg/semaine}$ est contre-indiquée.

L'association du ticagrelor avec les inhibiteurs puissants du CYP3A4 (kétoconazole, clarithromycine, vérapamil, ritonavir et atazanavir) est contre-indiquée du fait d'une augmentation importante de l'exposition au ticagrelor.

Précautions d'emploi des antiagrégants plaquettaires

Utilisation avec prudence si risque hémorragique : intervention chirurgicale, traumatisme, lésion susceptible de saigner

En cas d'intervention chirurgicale ou de biopsie le traitement devra être interrompu ou modifié selon l'indication du traitement et le caractère plus ou moins invasif de l'intervention

Ticlopidine : surveillance de la NFS tous les 15 jours durant les 3 premiers mois de traitement