80. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des antiulcéreux

Interactions médicamenteuses des antiulcéreux – Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)

Antiulcéreux	Autres médicaments	Niveau	Effet
Cimétidine	Carvedilol	CI	Augmentation des concentrations du carvedilol, préjudiciable dans le cas du traitement de l'insuffisance cardiaque avec la cimétidine utilisée à des doses ⩾ 800 mg/j
	Métoprolol	CI	Augmentation des concentrations du métoprolol préjudiciable dans le cas du traitement de l'insuffisance cardiaque avec la cimétidine utilisée à des doses ⩾ 800 mg/j
	Carmustine Lomustine	AD	Toxicité médullaire accrue par inhibition du métabolisme hépatique de la carmustine et de la lomustine
	Phénytoïne Fosphénytoïne	AD	Augmentation des concentrations plasmatiques de phénytoïne avec possibilité d'apparition des signes habituels de surdosage
IPP	Atazanavir	AD	Diminution très importante des concentrations d'atazanavir, avec risque d'échec thérapeutique

Remarques générales concernant les interactions médicamenteuses

- Parmi les anti-H2, la cimétidine possède un effet inhibiteur enzymatique, d'où les interactions de niveau « précautions d'emploi » avec de nombreux médicaments.
- Parmi les IPP, le lansoprazole, par effet inducteur enzymatique, peut entraîner des interactions de niveau « précautions d'emploi » avec de nombreux médicaments.
- Espacer de 1 à 2 heures les prises orales de topiques gastro-intestinaux de celles des antiulcéreux et de tout médicament à marge thérapeutique étroite.

Précautions d'emploi des antiulcéreux

- Vérifier la bénignité des ulcères gastriques avant traitement.
- Ne pas arrêter brutalement le traitement avant d'avoir constaté la cicatrisation de l'ulcère.
- Utiliser les anti-H2 avec prudence chez les sujets âgés, les insuffisants rénaux ou hépatiques.
- Éviter toute utilisation prolongée de sucralfate chez les insuffisants rénaux (risque d'accumulation aluminique) et chez les sujets hypophosphatémiques (risque de déplétion phosphorée).
- Grossesse : utilisation déconseillée des antisécrétoires (innocuité non établie).
- Les interactions médicamenteuses font l'objet de précautions d'emploi lorsque les antiulcéreux sont associés. Ainsi, les antisécrétoires antihistaminiques H2 associés aux topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants entraînent une diminution de l'absorption digestive de l'antihistaminique H2 : administrer les antihistaminiques H2 à distance (plus de 2 heures) des topiques gastro-intestinaux et antiacides.