

e 81. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des antiacides et pansements gastro-intestinaux

Interactions médicamenteuses des antiacides et pansements gastro-intestinaux

En cas d'administration d'autres médicaments pris simultanément : retard ou diminution de l'absorption de certains d'entre eux.

Exemples : digoxine, antihistaminiques H2, bêtabloquants, corticoïdes, kétoconazole, sels de fer, etc.

Précautions d'emploi des antiacides et pansements gastro-intestinaux

- Respecter un intervalle de 2 h entre les prises d'antiacides ou de topiques gastro-intestinaux et d'autres médicaments :
 - acide acétylsalicylique,
 - antisécrétoires antihistaminiques H2,
 - aténolol,
 - biphosphonates,
 - cationrésines,
 - chloroquine,
 - cyclines,
 - digitaliques,
 - éthambutol,
 - fer,
 - fexofénadine,
 - fluor,
 - fluoroquinolones,
 - glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone en traitement substitutif),
 - hormones thyroïdiennes,
 - indométacine,
 - isoniazide,
 - kétoconazole,
 - lansoprazole,
 - lincosamides,
 - métoprolol,
 - neuroleptiques phénothiaziniques,
 - pénicillamine,
 - phosphore,
 - propranolol,
 - sulpiride.
- Chez les dialysés chroniques, prendre en compte la présence des sels d'aluminium (risque d'encéphalopathie en cas d'administration prolongée).
- Lors de l'utilisation de silicones, de silicates (argiles), faire preuve de prudence en cas de mégacolon.