



82. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des médicaments du RGO

*Interactions médicamenteuses des médicaments
du reflux gastro-œsophagien (RGO) –
Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)*

Médicaments du reflux gastro-œsophagien	Autres médicaments	Niveau	Effet
Cimétidine	Carvedilol	CI	Augmentation des concentrations du carvedilol, préjudiciable dans le cas du traitement de l'insuffisance cardiaque avec la cimétidine utilisée à des doses ≥ 800 mg/j
	Métoprolol	CI	Augmentation des concentrations du métoprolol préjudiciable dans le cas du traitement de l'insuffisance cardiaque avec la cimétidine utilisée à des doses ≥ 800 mg/j
	Carmustine Lomustine	AD	Toxicité médullaire accrue par inhibition du métabolisme hépatique de la carmustine et de la lomustine
	Phénytoïne Fosphénytoïne	AD	Augmentation des concentrations plasmatiques de phénytoïne avec possibilité d'apparition des signes habituels de surdosage
IPP	Atazanavir	AD	Diminution très importante des concentrations d'atazanavir, avec risque d'échec thérapeutique

Remarques générales concernant les interactions médicamenteuses :

- Parmi les anti-H2, la cimétidine possède un effet inhibiteur enzymatique, d'où les interactions de niveau « précautions d'emploi » avec de nombreux médicaments.
- Parmi les IPP, le lansoprazole, par effet inducteur enzymatique, peut entraîner des interactions de niveau « précautions d'emploi » avec de nombreux médicaments.
- Espacer de 1 à 2 heures les prises orales de topiques gastro-intestinaux de celles des antiulcéreux et de tout médicament à marge thérapeutique étroite.

*Précautions d'emploi des médicaments
du reflux gastro-œsophagien*

Gels antireflux	Respecter un intervalle de 2 h entre la prise de gels antireflux et d'autres médicaments Chez les dialysés chroniques, prendre en compte la présence de sels d'aluminium
Antisécrétoires	Grossesse : utilisation déconseillée