



97. Interactions médicamenteuses et précautions d'emploi des antihistaminiques

*Interactions médicamenteuses -
Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)*

| Anti-histaminiques | Autres médicaments | Niveau | Effet | Remarques et conseils |
|----------------------------|--------------------|--------|--|--|
| Antihistaminiques sédatifs | Alcool | AD | Majoration de l'effet sédatif de l'antihistaminique | L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite des véhicules et l'utilisation des machines |
| Mizolastine | Antiprotéases | CI | Risque de troubles du rythme ventriculaire, notamment des torsades de pointe | Si cela est possible, interrompre le traitement torsadogène non anti-infectieux Si l'association ne peut être évitée, contrôler préalablement le QT et surveiller l'ECG |
| | Clarithromycine | CI | | |
| | Érythromycine | CI | | |
| | Itraconazole | CI | | |
| | Kétoconazole | CI | | |
| | Télithromycine | CI | | |

Précautions d'emploi des antihistaminiques

- Utilisation déconseillée en cas de grossesse et d'allaitement
- Mizolastine : faible potentiel d'allongement de l'intervalle QT ; le sujet âgé peut être sensible aux effets sédatifs et à ses effets potentiels sur la repolarisation cardiaque