

Consultation initiale	Date	Patient n°		IDE :	
Observance	Image corporelle	Estime de soi	Stress	Deuil pathologique	Autre diagnostic infirmier posé
<p>1. Non-observance Aveu de non-observance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'adhère pas • non-respect des rendez-vous • augmentation du poids • stagnation du poids <p>2. Connaissances insuffisantes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manque de connaissances théoriques ou pratiques • Illusions sur son état de santé • Erreurs dans l'application • Non-intégration du traitement aux habitudes de vie • Anxiété • État dépressif <p>3. Prise en charge inefficace du programme thérapeutique Désir d'adhésion au traitement mais :</p> <ul style="list-style-type: none"> • difficultés d'organisation • difficultés d'intégration <p>Reprise du poids/ stagnation</p> <p>4. Conflit décisionnel Lors d'un choix :</p> <ul style="list-style-type: none"> • doute • peur des conséquences • hésitation, report de la décision • angoisse • signes physiques de détresse ou de tension 	<p>1. Image corporelle perturbée À l'égard du corps :</p> <ul style="list-style-type: none"> • réaction verbale négative • réaction non verbale négative • refus de regarder • refus de toucher • dissimulation • exhibition • sentiments négatifs • désespoir • impuissance • vulnérabilité • inquiétude face aux changements • dépersonnalisation du corps • comportement autodestructeur 	<p>1. Estime de soi perturbée Propos dévalorisants sur soi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sentiment de honte, de culpabilité • sentiment d'incapacité à faire face aux événements • commentaires négatifs sur soi • incapacité de fixer des objectifs • indécision • incapacité à résoudre des problèmes • signes de dépression • besoin excessif d'être rassuré ou approuvé • piètre apparence • comportement autodestructeur • recherche du rôle de victime • réticence à tenter de nouvelles expériences • rejet sur autrui de la responsabilité de ses problèmes • hypersensibilité à la critique • mégalomanie <p>2. Diminution chronique de l'estime de soi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Échec fréquent : <ul style="list-style-type: none"> – dans la vie personnelle – dans la vie professionnelle • Docilité exagérée • Caractère influençable • Manque d'assurance ou passivité 	<p>1. Stratégie d'adaptation inefficace</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incapacité de faire face à la situation • Incapacité à demander de l'aide • Emploi inapproprié des mécanismes de défense • Incapacité à remplir les obligations inhérentes à son rôle • Inquiétude chronique, anxiété • Difficulté à s'adapter aux facteurs de stress de la vie • Comportement destructeur envers soi ou les autres • Accident fréquent, maladies fréquentes • Incapacité de répondre à ses besoins fondamentaux • Passivité • Dégradation de la vie sociale <p>2. Anxiété Anxiété d'ordre physique, émotionnelle (sentiments et comportements) et cognitive</p> <p>3. Sentiment d'impuissance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expression directe ou non d'insatisfaction face à l'incapacité de maîtriser une situation ayant des conséquences fâcheuses sur la vision d'avenir et le mode de vie de la personne • Apathie, colère • Violence, agressivité, anxiété • Malaise, résignation • Dépression • Passivité 	<p>1. Deuil anticipé Expression de détresse face au risque de perte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • déni • culpabilité • colère • tristesse • altération des habitudes alimentaires • altération des habitudes de sommeil • altération des rapports sociaux • altération des modes de communication <p>2. Deuil disfonctionnel Incapacité de s'adapter à la perte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • déni prolongé et mélancolique • réaction émotionnelle retardée • incapacité de mener une vie normale • isolement et repli sur soi • inaptitude à créer de nouveaux liens ou à se créer de nouveaux intérêts • incapacité de refaire sa vie après la perte 	