

100	Normal, pas de plaintes, pas de symptômes évidents de maladie
90	Apte à reprendre une activité normale Quelques signes et symptômes de maladie
80	Activité normale mais avec peine Quelques signes et symptômes de maladie
70	Subvient à ses propres besoins, incapable de poursuivre une activité normale ou un travail actif
60	Nécessite une aide occasionnelle mais est capable de subvenir à la plupart de ses propres besoins
50	Nécessite une aide importante et des soins médicaux fréquents
40	Incapable, nécessite une aide et des soins spéciaux
30	Totalement incapable, dans certains cas hospitalisation conseillée, bien que la mort ne soit pas imminente
20	Très gravement malade, traitement actif nécessaire
10	Moribond irréversible
0	Mort

Plus le pourcentage est faible, plus le pronostic vital est engagé.

D'après : Karnofsky D., *The clinical evaluation of chemotherapeutic agents in cancer*. Columbia University Press, New York. 1949 : 191-205.

© Ce document est un outil complémentaire au livre *La Consultation infirmière*, ouvrage collectif publié aux éditions Lamarre. IS, 2014. Isbn : 978-2-7573-0735-9 (DR). Chapitre 12, « Consultation de seconde ligne en soins palliatifs » de Brigitte Hérisson.